

Cáncer de estómago

Puerto Rico, 2011-2015

El cáncer de estómago ocurre cuando las células de los tejidos estomacales crecen descontroladamente y causan daño al tejido sano. Aunque existen varios tipos de cáncer de estómago, el más común es el adenocarcinoma, que ocurre en la capa celular más interna del estómago, llamada la mucosa.



Infección con
Helicobacter pylori

FACTORES DE RIESGO



Obesidad



Ser hombre



Fumar

Basado en los datos del periodo de 2011-2015,

1 de cada 95 personas podría desarrollar **cáncer de estómago** durante su vida.

que nazcan hoy en Puerto Rico

Síntomas

- Náuseas o vómitos
- Pérdida de peso
- Dolor en el abdomen
- Pobre apetito
- Indigestión o acidez
- Sangre en excreta

1,819 casos nuevos

1,105 muertes

Desde el año 2000 al 2015 se ha observado una **disminución** anual en la incidencia de cáncer de estómago de **3.2%** en hombres y **1.8%** en mujeres.

Tasas de incidencia y mortalidad

Periodo 2011-2015, tasas por cada 100,000 personas



Incidencia: 12.1
Mortalidad: 7.6




Incidencia: 8.3
Mortalidad: 4.8

La mediana de edad de diagnóstico para cáncer de estómago es:

71
Años

6ta
Causa de muerte por cáncer en hombres

Porcentaje de casos nuevos de cáncer de estómago por sexo:



● Hombres
● Mujeres

El **68%** de los casos nuevos de cáncer de estómago fue en personas de 65 años o más de edad.



El **76%** de las muertes por cáncer de estómago fue en personas de 65 años o más de edad.

Prevención

Cernimiento



Evitar y tratar la infección con Helicobacter pylori



Aumentar la actividad física



Evitar fumar

Aunque no existen recomendaciones formales para el cernimiento de cáncer de estómago, se recomienda la endoscopia a personas que estén a riesgo, para evitar que se desarrolle la enfermedad o detectarla lo más temprano posible.