

Leucemia Linfocítica Crónica: Puerto Rico, 2011-2015

El cáncer que se origina en los tejidos que forman la sangre se le conoce como leucemia. La leucemia linfocítica crónica comienza en los glóbulos blancos de la sangre conocidos como linfocitos ubicados en la médula ósea.

FACTORES DE RIESGO



*LLC: leucemia linfocítica crónica

Basado en los datos del período 2011-2015, **1 de cada 320 personas** que nazca hoy en Puerto Rico podría desarrollar leucemia linfocítica crónica durante su vida.

Síntomas:


- Pérdida de peso inexplicable
- Nódulos linfáticos inflamados
- Cansancio y debilidad
- Infección y fiebre
- Dolor o sensación de satisfacción



Tasas de incidencia y mortalidad

Período 2011-2015, tasas por cada 100,000 personas

	Incidencia	Mortalidad
♂	3.9	0.5
♀	2.4	0.3




Desde el año 2000 al 2015 se ha observado un **aumento** anual en la incidencia de leucemia linfocítica crónica de **6.9%** en hombres y **7.9%** en mujeres.

Mediana de edad al momento de diagnóstico:



Mediana de edad al morir: 78 años

Porcentaje de casos nuevos por sexo de leucemia linfocítica crónica



La mayor proporción de casos nuevos de leucemia linfocítica crónica se diagnosticó en personas de **65 años de edad o más (73%)**.

Prevención

Se conocen pocos factores de riesgo para la leucemia linfocítica crónica y la mayoría de las personas que padecen esta enfermedad no tienen factores de riesgo conocidos. Por lo tanto, no se sabe como prevenir este cáncer. Si usted tiene síntomas o sospecha que está o podría estar a riesgo de tener leucemia linfocítica crónica, consulte a su médico inmediatamente.



Cernimiento

Conteo completo de células sanguíneas

Prueba de mutación de genes

Aspiración de médula ósea y biopsia